

Wanneer?

Als de voedster is overleden, onvoldoende of geen melk heeft, de jongen nog te weinig zelf kunnen drinken, als de jongen gevonden zijn. Wanneer de jongen heel erg onrustig zijn of zelfs uit het nest kruipen, (dit doen ze als ze honger of dorst hebben). Als de jongen rimpelig zijn, dan zijn ze aan het uitdrogen en hebben O.R.S. nodig.

Eerst O.R.S. dan pas melk (dit moet altijd ongeacht de leeftijd)

De kleintjes krijgen de eerste 5 voedingen alleen O.R.S. (elektrolyten oplossing). O.R.S. is onder verschillende namen en merken te koop bij de drogist, apotheek en dierenarts. Deze elektrolyten geeft u 1 tot 2 ml per keer om de 3 uur behalve 's nachts. De oplossing is 24 uur te bewaren in de koelkast. Breng het spuitje zonder speen voorzichtig aan de zijkant vlak achter de voortandjes tussen de lipjes, met speen gewoon aan de voorkant, en geef de vloeistof echt druppelsgewijs, wacht tot het diertje slikt en dan de volgende druppel, anders verslikken ze zich.

Zodra ze het door hebben gaat het vlugger en makkelijker, maar zeker nooit overhaasten.

Van O.R.S naar melkvoeding

De 6^e voeding (zie voerschema onderaan) wordt er 1/3 melk met 2/3 O.R.S. gegeven. De 7^e voeding 1/2 melk en 1/2 O.R.S. De 8^e voeding 2/3 melk en 1/3 O.R.S. Daarna gewoon volgens het schema met de melk verder gaan.

Hoe te handelen met de kleintjes

Is de voedster niet agressief tegen de jongen, laat ze dan gewoon bij de moeder. U haalt ze er even uit om vocht of voeding te geven en zet ze weer terug. Kunnen ze niet bij moeder blijven, dan dienen ze in een plastic bak met een fleecedekentje als bodembedekking op een rustige plek onder een warmtelamp gehouden te worden.

De kap met beveiligingskorf voor de warmtelamp ziet u hiernaast, met een warmtelamp van 150 watt. Zeker de eerste 14 dagen is een warmtebron van levensbelang.

De warmtelamp dient 60 – 65 cm boven de ligplaats met de jongen te hangen, gemeten vanaf de jongen en niet vanaf de bovenzijde van het verblijf. Dit een paar keer controleren door te voelen in het nekje, dat moet behaaglijk warm aanvoelen, niet lauw of heet.

Een lichtgekleurde fleecedeken is handig omdat u dan goed kan zien of ze keutelen en al zelf plassen. Een extra vierkant geknipt stukje fleecedeken kan als een soort holletje neergelegd worden, ze schuilen daar onder wanneer ze even koeler willen liggen. Wanneer de jongen de oogjes open hebben mogen ze vanaf dat moment ook altijd een pluk hooi en een bakje (geen flesje) water (in het begin een klein laagje) in de bak hebben. Ze moeten 24/7 over hooi en schoon drinkwater kunnen beschikken. Zodra ze het hooi ook echt goed eten, dan mag u beginnen met brokjes. Geef er eerst een paar uit de hand tot ze echt er van eten, dan pas een bakje neerzetten. Met groenvoer wachten tot ze minstens 3 weken oud zijn en de melk rustig aan wordt afgebouwd. Kruik of elektrisch dekentje zijn eventuele noodoplossingen, een warmtelamp blijft de beste optie. Ze zijn niet zo erg duur en zijn verkrijgbaar bij winkels zoals de Boerenbond, Welkoop, Horticoop en vergelijkbare zaken. Zodra ze de warmtebron niet meer nodig hebben, kunnen ze in een groter verblijf met een lekkere laag hooi als bodembedekker er in (prettiger dan stro voor de kleintjes) en een paar keer per dag een plukje hooi om van te knabbelen en altijd vers water. Geen flesje, dit verhoogt het risico op gasvorming.



Wegen

Weeg de diertjes altijd 's morgens voor u gaat voeren. De eerste paar dagen kunnen ze iets afvallen, na ongeveer een week zullen ze zeker moeten gaan aankomen.

Hulp bij plassen

De eerste 3 tot 4 dagen moeten de kleintjes geholpen worden bij het plassen. Neem een zachte tissue en wrijf zachtjes over het onderbuikje en geslachtsdeel om de urinestroom op gang te brengen, en ga daarmee door tot het stopt met plassen. Keutelen kunnen ze wel direct zelf, let alleen op dat het mooie droge keuteltjes blijven.

Melk aanmaken

Kijk in het voedingschema hoeveel u klaar moet maken, maak dan een hoeveelheid voor de hele dag. De melk kan het beste minstens 4 uur van tevoren worden klaargemaakt, zo neemt de poeder het water goed op. Neem 2 delen* Foxvalley 30/50 en doe er dan 3 delen* water bij van minstens 80° C. Goed roeren tot de poeder geheel is opgelost en er geen klontjes in zitten. Laat de melk afkoelen en zet het in de koelkast (24 uur houdbaar).

De melk moet iets dunner zijn dan magere yoghurt, wel zo vloeibaar dat het makkelijk door de speen kan.



*) Een deel is een maateenheid zoals een maatschepje zie voorbeeld hiernaast! Heeft u die niet, dan kan ook een koffieschepje of zelfs een schoon flessendopje worden gebruikt .

De speentjes en spuitjes

De speentjes hebben al een opening, niet doorprikken dus! Wel ter controle altijd het spuitje vullen met water, speentje er op en door het speentje spuiten. Eén of twee smalle straaltjes is prima! De spuit altijd weg doen als hij te stroef loopt, hij kan dan ineens doorschieten met verslikking van het kleintje tot gevolg. De spuitjes na gebruik uit elkaar halen, goed afspoelen en uit elkaar bewaren, pas in elkaar zetten als ze weer gebruikt worden, zo gaan ze het langst mee. Speentjes nooit uitkoken, gewoon afspoelen met warm water!

Twee soorten melk mengen

Een andere melksoort mengen met de nieuwe soort:

De eerste dag $\frac{2}{3}$ oude melk en $\frac{1}{3}$ nieuwe melk. De tweede dag half om half. De derde dag $\frac{1}{3}$ oude melk en $\frac{2}{3}$ nieuwe melk. De vierde dag alleen de nieuwe melk zoals aangegeven in het voerschema. Zo gaat het meestal probleemloos!

Het voeden

Gebruik in het begin altijd een 1 ml spuitje, deze druppelt langzaam en loopt lichter dan de grotere. Plaats de speen op de spuit en duw die tot aan het smalle gedeelte van de speen, dit geldt ook voor de 3 ml. Bij de 5 ml en de 10 ml plaats je de speen alleen over het brede deel, ze moeten dan goed kunnen zuigen. Bij verslikken kunnen de diertjes gaan rochelen en krijgen meestal longontsteking. Gebruik om diezelfde reden nooit flesjes, ook niet al zijn ze speciaal voor jonge dieren. Voor deze kleintjes zijn ze absoluut ongeschikt, de diertjes krijgen vaak te veel voeding in 1 keer naar binnen wat het risico op verslikking nog meer vergroot. Wacht bij rochelen niet af maar ga meteen naar een dierenarts voor antibioticum (bijvoorbeeld Novadox).

Vasthouden

Zeer jonge diertjes houdt u rechtop (zoals ze staan of zoals het stokstaartje en iets voorover). Zodra ze zelf op 4 pootjes kunnen staan, laat u ze staan, leg uw hand om ze heen en steun ze door beide schouders met een vinger te omvatten. Zo steunt u ze en staan ze toch op hun eigen voetjes.



Melkformule

De gebruikte voedingsformule bestaat uit een poeder waarvan het vet- en eiwitgehalte de moedermelk nagenoeg benadert.

Melkproducten en benodigdheden zijn te bestellen via de website van Stichting KonijnenBelangen:

<http://www.konijnenbelangen.nl/winkel.php?wid=1&menu=winkel>

Voor hulp en advies bij het grootbrengen neem contact op met onze konijnenbaby-expert:

Tel: 0031(0)623392009 - Email: ria@konijnenbelangen.nl

Voedingsschema					
<i>Het schema is een richtlijn om de leeftijd te bepalen en de hoeveelheid voeding die het moet hebben. Dit schema is gebaseerd op het middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg ras zal wat minder drinken en een vlaamse reus meer.</i>					
Gewicht	Leeftijd	Ochtend	Middag	Avond	Uiterlijke kenmerken
20 gram	-	2 ml	2 ml	2 ml	
25 gram	-	3 ml	3 ml	3 ml	
30 gram	-	3 ml	3 ml	3 ml	
35 gram	-	4 ml	4 ml	4 ml	
40 gram	-	4 ml	4 ml	4 ml	
45 gram	1 dag	5 ml	5 ml	5 ml	
50 gram	2 dagen	5 ml	5 ml	5 ml	Kaal, navel zichtbaar, ogen dicht, oren plat
60 gram	3 dagen	6 ml	6 ml	6 ml	Vacht begint te groeien
70 gram	4 dagen	6 ml	6 ml	6 ml	
80 gram	5 dagen	7 ml	7 ml	7 ml	
90 gram	6 dagen	7 ml	6 ml	7 ml	Vanaf 8 dagen kunnen ze vaak al horen
100 gram	1 week	8 ml	2 ml	8 ml	
125 gram	10 dagen	8 ml	2 ml	8 ml	Ogen gaan open tussen de 10 ^e en 15 ^e dag
150 gram	2 weken	8 ml	-	10 ml	Oren gaan overeind komen
200 gram	3 weken	5 ml	-	15 ml	
250 gram	4 weken	-	-	18 ml	Let op de opmerkingen hieronder!
300 gram	5 weken	-	-	13 ml	Elke dag 2 ml er af tot 12 ml
350 gram	5,5 week	-	-	8 ml	Elke dag 2 ml er af tot 4 ml
400 gram	6 weken	-	-	3 ml	Laatste keer melkvoeding